

le comportement avait pour but de faire fuir l'intrus et j'étais pour lui l'élément gênant mais non visé.

L'audace dont a fait preuve cet oiseau montre merveilleusement l'intensité de certaines réactions de défense du territoire et c'est pour cette raison qu'il m'a paru utile de rapporter les faits comme je les ai vécus.

Un certain rapprochement peut être fait entre cette observation et celle rapportée dans *Aves*, 2 (1965) : 11, concernant la réaction d'un Phragmite des joncs à la repasse de son chant. Une analogie peut également être établie avec la note du *Gerfaut*, 49 (1959) : 400, relative à la capture à la main par Mme Arnheim d'un Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*).

P. DACHY.

*
**

Découverte d'un dortoir de Tourterelles turques (*Streptopelia decaocto*) à Liège.

Depuis quelques années, les Etourneaux (*Sturnus vulgaris*) utilisent, comme dortoir, les arbres du boulevard Emile de Laveleye à Liège.

Ce grand boulevard est occupé en son centre par un large terre-plein bordé de deux rangées de marronniers de 15 à 20 mètres de haut.

En décembre 1966, nous remarquons la présence de Tourterelles turques, sous les grappes d'Etourneaux qui s'abattent sur les branches supérieures. Un recensement partiel nous permet d'évaluer la population de Tourtelles à 900 ± 200 exemplaires. Le 7 janvier 1967, entre 16.30 h. et 17.00 h., nous comptons 800 ± 80 ex pour les 130 arbres occupés, ce qui représente une moyenne de 6 Tourterelles par arbre.

Comme, à notre connaissance, un comportement semblable n'a pas encore été signalé chez cette espèce, nous croyons utile d'en faire mention au plus tôt. Des observations plus suivies ont été réalisées depuis cette découverte et seront publiées ultérieurement.

P. COLLETTE et R. THOMAS.

*
**

Aberrations de plumage.

A Gaurain, le 14 X 1966, P. Dachy relève dans ses filets un Pipit des prés (*Anthus pratensis*) dont la tête et le cou sont entièrement blancs. Le 1 I 1966, R. Canon capturerait à Quevaucamps un exemplaire mâle de Merle (*Turdus merula*) affecté de la même particularité. Début octobre 1966, M. Piazza remarque parmi les nombreux Merles noirs circulant dans le parc de Koekelberg (Bruxelles) plusieurs individus présentant une tendance plus ou moins prononcée à l'albinisation. De même, le 11 XII 1966, est présent à Uccle (Bruxelles), un Merle mâle entièrement blanc à l'exception de la tête noire et de quelques taches de même couleur sur les ailes (J. Clément). D'autre part, L. Delplanque observe un Merle noir albinos, à Sirault (Hainaut), le 2 I 1967 et à Tihange/Huy, un Merle mâle (observé depuis l'été 1966 au moins) présente des plumes blanches à la nuque et au côté droit du cou (J.L. Dambiermont). Ces données confirment que l'albinisme partiel n'est pas très rare chez cette espèce.

Parmi une troupe de Verdiers (*Chloris chloris*) observée le 24 XI 1966 à Zeebrugge, S. Lhoest et S. Baugniet observent un exemplaire albinisant : ensemble jaune