

Capture d'un Ecureuil (*Sciurus vulgaris*) par une Buse (*Buteo buteo*).

Le 21 décembre 1968, il nous a été donné d'observer la capture d'un Ecureuil par une Buse variable. L'Ecureuil avait été attiré par les charognes placées à l'intention des rapaces et des corvidés en bordure d'une coupe de taillis. La Buse, qui visitait régulièrement le charnier, était perchée dans un des rares arbres mis en réserve qu'elle quitta en planant. Arrivée au-dessus de l'Ecureuil, elle descendit brusquement puis remonta immédiatement et se posa à quelques mètres de lui qui ne semblait pas se soucier de la présence du rapace et continuait à manger. Après quelques minutes, sans doute repus, il s'éloigna tranquillement en longeant la coupe, puis il entra dans une basse broussaille où il disparut. C'est à ce moment que la Buse s'envola pour venir se poser près des buissons. Elle repéra sa proie et bondit au-dessus de la broussaille en battant des ailes. Elle resta ainsi suspendue un bref instant et se laissa tomber, les ailes relevées. L'Ecureuil fut capturé alors qu'il était encore dans les broussailles et la Buse, empêtrée, resta les ailes ouvertes pendant toute la mise à mort. Lorsqu'elle se dégagea, l'Ecureuil semblait vivre encore un peu car elle le reprit et le frappa du bec. Pour le dépecer, elle le tira à découvert en le traînant d'une patte. Le dépecage dura près d'un quart d'heure. Ensuite, elle s'envola avec le reste de la victime.

On pourrait formuler plusieurs hypothèses pour tenter d'expliquer ce comportement. C'est pourquoi l'interprétation suivante, pour plausible qu'elle soit, est présentée sous toute réserve.

La Buse, habituée à venir se nourrir à cet endroit depuis une semaine environ, aurait donc été attirée d'abord par les charognes (premier stimulus). Mais la place est prise : l'Ecureuil (assimilé à un mordant ?) a priorité. Le rapace, surpris, hésite et se pose à côté, en attente. L'Ecureuil s'en allant devient alors, en se déplaçant, un deuxième stimulus plus fort que le premier. L'attention de la Buse passe de la charogne plus l'Ecureuil vers l'Ecureuil tout seul : après l'avoir vu comme un concurrent à la charogne, la Buse le voit comme une proie quand il s'écarte.

J.C. et J.P. MAES.

Contribution à la répartition des zones de nidification du Vanneau (*Vanellus vanellus*) en Belgique.

La mise au point parue dans cette revue (*Aves*, 5 : 113-124) reprenait uniquement les données bibliographiques pour la partie septentrionale du pays. En effet, l'enquête lancée en 1967 ne couvrait que la partie wallonne du territoire, son but principal étant de mettre en évidence l'extension vers le Sud de l'aire de reproduction du Vanneau. Il en résultait nécessairement une certaine imprécision au sujet de la limite de ce que nous avons appelé la zone septentrionale.