



Outre certains cantonnements qui se confirment davantage, cette période est surtout marquée par des naissances qui s'enchaînent dans les divers habitats que constitue le maillage si diversifié des marais. Ecrins incontestés, les colonies frontalières battent leur plein et les parents se montrent enfin davantage sur la partie publique lors de leur quête de nourriture pour des rejetons sans cesse plus nombreux. La fraîcheur et l'extrême humidité de ce début de printemps ne semblant pas avoir impacté anatidés, ardédés et autres espèces dont les jeunes peuvent être le plus facilement détectés.

Si les nichées commencent, comme de coutume, à être découvertes à partir du 05-05 pour le **Canard Colvert**, du 19-05 pour le **Canard chipeau** et le **Fuligule milouin** et le 22-06 pour le **Fuligule morillon**, une ♀ de **Canard souchet** et ses 5 petits pulli observés très brièvement le 01-06 sur l'étang A confirment la reproduction locale de l'espèce. Il n'en est malheureusement pas de même pour les sarcelles qui, elles, sont peu contactées : un unique ♂ de **Sarcelle d'hiver** le 19-05 et minimum 2♂ & 1♀ de **Sarcelle d'été** à seulement 7 reprises durant la période couverte par cette chronique. Les fréquentes parades de ces derniers pour s'attirer les faveurs de la belle pourraient néanmoins déboucher plus tard sur cet heureux événement. Plusieurs couples de **Tadorne de Belon** semblent avoir noués des liens et être attirés par l'îlot aux laridés, sans que cette relation ne débouche sur une union plus concrète. Un ♂ de **Canard siffleur** est observé du 11 au 13-06 et, plus étonnant, un **Garrot à œil d'or** les 30-06 & 03-07. Si les 1^{ers} pulli de **Grèbes castagneux** et **huppé** sont respectivement observés les 19-05 et 28-05, aucun **Grèbe à cou noir** ne semble avoir concrétisé sa reproduction au moment de coucher ces lignes sur le papier. Les 1^{ers} jeunes **Cygnes tuberculés** montrent le bout du bec à partir du 21-05. Hormis l'**Oie cendrée** dont 20 pulli répartis en 3 crèches sont dénombrés le 12-05, les autres espèces férales sont bien moins prolifiques : 1 nichée de 5 juv. pour la **Bernache du Canada** et de simples essais de cantonnement sans lendemain (apparemment) pour l'**Ouette d'Égypte**. Contacté régulièrement partout par ailleurs, 3 **Martins-pêcheurs** aux comportements nuptiaux sont notés sur Hensies durant une fourchette de temps propice à leur installation.

Pouponnière toujours aussi importante et primordiale, la héronnière d'Hensies abrite de plus en plus de pulli des différents ardédés qui la peuplent, au fur et à mesure des naissances. Un bilan exhaustif suivra à l'issue de la période de reproduction. En proportions très variables, les 3 cormorantières du site accueillent au minimum 186 nids. De retour à partir du 04-05, 4 cantons sont rapidement réinvestis par le **Blongios nain** sur l'ensemble des marais. A l'issue de cette période de vocalises nuptiales/territoriales, ce petit héron se montre beaucoup plus discret. Une **Cigogne noire** en migration active vers le NE est notée le 12-05 et un total de 6 **Cigognes blanches** est obtenu du 03-05 au 23-06.

Après parades et constructions de nids, un apport de becquée par un ♂ de **Busard des roseaux** est mentionné le 13-06 au niveau de la roselière A. Des **Balbusards pêcheurs** sont observés isolément les 27-05 puis 05, 14 & 29-06, 1 **Milan royal** le 13-05 et 1 **Milan noir** du 03 au 11-05 (pour peu qu'il s'agisse du même). Pour la plupart nicheurs locaux probables, de 1 à 2 **Bondrées apivores** sont régulièrement contactées dans le périmètre de la réserve. Un couple de **Faucon crécerelle** est assez souvent surpris lors de recherches de nourriture au sein des habitats favorables du site et 1 **Faucon pèlerin** est vu le 09-06. Sans jamais atteindre de gros effectifs, plusieurs **Faucons hobereaux** tournoient journalièrement dans les airs à la recherche des odonates, abondants cette saison. Une **Effraie des clochers** est repérée par ses cris en vol le 05-05, au moins 2 cantons de **Chouette hulotte** ainsi qu'une nichée nourrie sont accrédités et 1 **Hibou moyen-duc** est surpris le 21-06. Le traditionnel couple de **Chevêche d'Athéna** est toujours bien présent aux abords de la ferme Slabbinck (essentiellement au niveau des saules têtards face au DEMNA) et vocalise abondamment. Assimilé à celui du Petit-Duc scops, leur « chant d'été » a, de la sorte, occasionné de bien tristes désillusions à ceux qui ont été victime de cette confusion lors d'une écoute matinale.

Les limicoles semblent peu fréquenter les zones humides durant cette période avec 1 **Petit Gravelot** le 08-05, max. 27 **Chevaliers guignettes** le 07-05 (6 sur les marais HHP et 21 sur le canal Hensies-Pommeroeul), 1 **Chevalier culblanc** à seulement 2 reprises, de 1 à 2 **Chevaliers gambettes** 3 fois en mai et de 1 à 2 **Chevaliers aboyeurs** du 06 au 17-05. Une dernière croule de **Bécasse des bois** intervient le 19-05.

Au moins un nid est occupé par la **Sterne Pierre-Garin** et le **Goéland cendré**. Les comptages éloignés de l'îlot aux laridés fournissent au max. 63 adultes en PN de **Mouette mélanocéphale** le 07-05 et au minimum 22 nids occupés le 27-05. Six adultes en PN de **Mouette pygmée** font une halte alimentaire le 06-05 puis un seul le lendemain, 2 adultes de **Guifette noire** le 11-05 puis un seul les 13, 14 & 28-05 et 1 **Sterne naine** le 14-05. Après plusieurs décennies sans contact, un **Labbe parasite** est repéré le 30-06 suite au ramdam que son intrusion provoque parmi les nombreux laridés nicheurs.

Plusieurs chants nuptiaux, ainsi que des parades aériennes mettent un terme à une série désastreuse de saisons maigres pour la **Tourterelle des bois**. Un ♂ de **Pie-grièche grise** réalise une brève halte le 06-05 et une **Caille des blés** le 11-06. Trois chanteurs différents d'**Hypolais polyglotte** s'installent un trop court instant et de 2 à 3 cantons sont défendus vocalement par la **Locustelle lusciniôide** sur une période bien plus en adéquation avec de probables reproductions. Un ♂ de **Traquet motteux** est observé les 07, 09 & 19-05 sur les marais et le canal Hensies-Pommeroeul, 1 **Mésange noire** le 14-06, 1 **Pipit farlouse** le 08-05, 1 **Bergeronnette des ruisseaux** sur le canal Hensies-Pommeroeul le 07-05 et au max. 6 **Chardonnerets élégants** le 08-06. Une nichée de **Bouvreuil pivoine** est découverte le 30-06. Au moins 2 cantons de **Pic épeichette** sont établis sur la partie publique des marais et de 1 à 2 **Pics noirs** sont essentiellement présents en mai.

Contributeurs : tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que leurs données aient été extraites du portail d'encodage www.observations.be ou nous soient parvenues par un autre canal. **Rédacteur** : Ph. Jenard pour le Comité de Gestion des Marais HHP, en partenariat avec le CRIE d'Harchies & la section NATAGORA - AVES MsTi. Adresse de contact : mons.tournai@aves.be