



Dans la continuité de la dernière chronique, l'hiver s'est bel et bien installé. Durant plusieurs semaines, des températures glaciales et des chutes de neige figent l'ensemble des marais HHP. Contribuant de la sorte à durcir les conditions d'hivernage des oiseaux qui sont déjà installés, tentent à le faire ou reprennent des forces et un repos mérité avant de poursuivre.

Les effectifs d'anatidés fluctuent selon les comportements adoptés par les individus qui transitent par les marais. Certains restent à demeure, quand d'autres continuent leur fuite face à la rigueur climatique. Cela entraînant des pics abrupts ou des concentrations plus étalées dans le temps. Les maxima respectifs étant de 893 **Canards Colverts** le 06-01 puis 1313 le 21-01, une 10<sup>aine</sup> de **Canards chipeaux** le 15-01, 118 **Canards souchets** les 06 & 29-01 puis toujours 109 le 26-02 (stable), 5 **Canards siffleurs** le 21-01, 39 **Sarcelles d'hiver** le 12-01, 184 **Fuligules milouins** le 15-01 puis 212 le 09-02, 133 **Fuligules morillons** le 06-01, 35 **Tadornes de Belon** le 27-01, 10 (7♂+3♀) **Garrots à œil d'or** à la fin-janvier/mi-février puis 13 (9♂+4♀) le 21-02, 18 (11♂+7♀) le 23-02 et 9 (5♂+4♀) le 26-02, ainsi que 14 **Harles bièvres** le 06-01 et encore 12 (7♂+5♀) un mois plus tard. Au maximum, 4 (1♂+3♀) **Harles piettes** fréquentent le site les 06 et 18-02, ainsi qu'au moins une **Erimature rousse** à une 10<sup>aine</sup> de reprises jusqu'au 12-02. Après une présence continue de 1 à 3 ind., le pic de 9 **Canards pilets**, noté le 16-02, est plus la conséquence d'un retour pré-nuptial à cette période où l'étau hivernal s'est déjà largement desserré. Hormis une parade nuptiale hâtive de **Grèbes huppés** le 17-02, les derniers jours de février confirment le basculement vers la saison de reproduction : 1<sup>ères</sup> parades tonitruantes de **Grèbes castagneux**, formation de plusieurs couples de **Canards Colverts**, parades et poursuites aériennes de **Canards chipeaux**. Après une absence d'un peu plus de deux mois, 3 **Grèbes à cou noir** sont observés à partir du 14-02 et la parade nuptiale d'un couple le 21-02. De 1 à 2 **Martins-pêcheurs** sont très irrégulièrement contactés jusqu'au 17-01. Présents depuis au moins la dernière décade de décembre 2016, les 12 (dont 3 juv.) **Cygnés de Bewick** continuent à stationner dans la réserve durant ces deux mois. Régulière mais fluctuante, l'**Oie rieuse** atteint au max. 23 ind. le 03-02. D'autre part, hormis 135 **Oies cendrées** le 17-01 et 225 **Bernaches nonnettes** le 19-02, les espèces férales certaines sont moins présentes avec 3 **Ouettes d'Égypte** le 01-02 et 19 **Bernaches du Canada** le 06-02. Un hybride **Bernache nonnette x Oie empereur** est peu renseigné à partir du 18-02.

Les 1<sup>ères</sup> **Cigognes blanches** (14 ind. en vol) sont notées le 16-02. Un **Héron garde-bœufs** affronte seul du 03 au 06-01 la froideur qui s'installe. Si l'**Aigrette garzette** n'est renseignée qu'à 4 reprises (avec un max. de 3 ind. le 16-02), les dortoirs accueillent 8 **Grandes Aigrettes** le 19-02 et 386 **Grands Cormorans** le 14-01. Ce dernier occupant déjà 105 nids le 26-02 dont un contenant des pulli. Dix-huit nids de **Héron cendré** sont également couvés le 26-02. Les roselières de Pommeroeul concentrent les hivernants de **Butor étoilé** avec des max. de 4 à 5 oiseaux jusqu'au 06-01 puis 1 à 3 de manière tout aussi régulière. Détecté à partir du 23-02, un ad en PN de **Mouette mélanocéphale** est rejoint par un second comparse fin de ce mois.

Toujours présents, l'immature et la ♀ de **Busard des roseaux** ne sont cependant vus isolément qu'à 3 reprises du 19-01 au 23-02. Une femelle/imm. de **Busard St-Martin** est vue 3 fois en janvier et un mâle l'est 4 fois en février. Un **Faucon pèlerin** est observé les 05-01 et 23-02. Fidèle à son habitude, une **Chevêche d'Athéna** prend un bain de soleil face au DEMNA le 26-02 et le dortoir de **Hibou moyen-duc** héberge 5 ind. le 03-01 et 2 seulement, deux jours plus tard.

Une **Bécasse des bois** prend son essor le 27-01 et un vol de max. 91 **Vanneaux huppés** est noté le 13-02. Régulière uniquement en février, la **Bécassine des marais** atteint au max. 6 ind. le 14. Un **Courlis cendré** est entendu le 02-01 puis vu en vol les 22, 25 & 26-02. Après 2 ind. le 12-01, 1 **Chevalier culblanc** est mentionné à 6 reprises en février. L'installation durable de conditions météorologiques drastiques n'a pas été synonyme d'un apport important d'hivernants nordiques. Si aucune abondance n'a pu être décelée, certaines espèces ont également à peine été vues. Les max. respectifs étant de 7 **Pipits spioncelles** les 01 & 05-02, 30 **Tarins des aulnes** le 09-02 (espèce observée à seulement 5 reprises), 10 **Grives mauvis** le 12-02 et 150 **Grives litornes** le 05-01. Un **Roitelet tb** est observé le 23-01, 1 **Grive draine** les 05 & 12-01 et 26-02, 30 **Chardonnerets élégants** les 02 & 12-01, 7 **Bouvreuils pivoinés** le 09-02, 1 **Sizerin cabaret** le 27-01 et 2 **Bruants jaunes** le 05-01. Après un hivernage local d'au moins 2 ind., le 1<sup>er</sup> chanteur de **Pouillot véloce** est entendu le 26-02. Qu'elles soient timides ou déjà assurées, ces premières strophes amoureuses font déjà reculer l'hiver ne fusse que symboliquement : 1<sup>ers</sup> chanteurs d'**Accenteur mouchet** le 12-02, de **Rougegorge familier** et de **Grive musicienne** le 19-02, ainsi que de **Bruant des roseaux** le 25-02.

**Contributeurs** : tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que leurs données aient été extraites du portail d'encodage [www.observations.be](http://www.observations.be) ou nous soient parvenues par un autre canal. **Rédacteur** : Ph. Jenard pour le Comité de Gestion des Marais HHP, en partenariat avec le CRIE d'Harchies & la section AVES MsTi. Adresse de contact : [mons.tournai@aves.be](mailto:mons.tournai@aves.be)