



Un printemps hivernal aux températures régulièrement polaires, qui frisent parfois les valeurs négatives, voilà ce qui prévaut depuis trop de saisons, au détriment des espèces insectivores qui peinent à se remplumer à leur retour en nos contrées.

Les concentrations d'anatidés s'amenuisent à l'approche de la saison de reproduction et seuls restent alors les nicheurs potentiels dont les comportements territoriaux et nuptiaux prédominent. Les ultimes maxima respectifs étant de 178 **Canards souchets** le 11-03 puis 38 le 07-04, 62 (42♂ & 20♀) **Canards chipeaux** le 14-03, une 20^{aine} de **Sarcelle d'hiver** en 1^{ère} décade de mars, 30 le 19-03 puis plus aucune donnée au-delà de l'observation de 3 couples dans des habitats favorables le 06-04, 159 **Fuligules milouins** le 19-03 et seulement 28 le 29-03, 51 **Fuligules morillons** le 19-03 puis 21 (14♂ & 7♀) le 29-03 et même 33 le 04-04 et 22 **Tadornes de Belon** le 07-04. Une 20^{aine} de **Canard siffleur** (max. 21 le 18-03) stationne jusqu'au 24-03 puis 4♂ & 3♀ le 26-03 et 2♂ & 2♀ le 08-04. De 5 à 7 **Canards pilets** sont présents en mars puis de 1 à 4 jusqu'à la mi-avril. Le 1^{er} ♂ de **Sarcelle d'été** est de retour le 11-03 et la 1^{ère} ♀ le 18-03. Par la suite, l'espèce est un peu plus notée en avril, sans jamais être abondante et des parades de ♂ auprès de leurs belles sont régulièrement observées sur Hensies. Un 1^{er} nid contenant des œufs de **Canard Colvert** est découvert le 23-04. Trois ♀ de **Harle piette** sont présentes en 1^{ère} décade de mars, 1 seule le 14-03 et 1♂ le lendemain. Après un max. de 24 (10♂ & 14♀) **Harles bièvres** le 04-03, ces hivernants désertent toujours davantage le site pour atteindre un dernier couple le 25-03 puis une ♀ tardive le 01-04. Le pic de **Garrot à œil d'or** pour cette période enregistre 7♂ & 5♀ le 11-03 et, après 3♂ & 2♀ encore observés le 28-03, un ultime contact de 1♂ & 1♀ intervient le 15-04. L'effectif local du **Grèbe à cou noir** s'étoffe progressivement passant de 4 ind. le 09-03 à 65 le 04-04. Une 1^{ère} parade nuptiale est observée le 31-03. Un 1^{er} nid de **Cygne tuberculé** est signalé le 10-04. Les **Bernache du Canada** et **Ouette d'Égypte** sont peu notées avec des max. respectifs de 10 ind. le 12-03 et 14 le 10-03. Un nid d'**Oie cendrée** est occupé sur Pommeroeul. Après un pic d'environ 230 **Bernaches nonnettes** le 19-03, les 4 dernières sont vues en vol le 08-04.

Environ 70 **Cigognes blanches** survolent le site ou s'y arrêtent brièvement du 06-03 au 26-04 (max. +/-60 le 06-03 en vol vers le NE). Un **Héron pourpré** est contacté le 20-04, 1 **Héron garde-bœufs** le 22-04, 1 **Bihoreau gris** le 28-04 et de 1 à 2 **Aigrettes garzettes** à une 10^{aine} de reprises tout au plus. La majorité de ces espèces étant déjà bien installée dans la héronnière frontalière. Malgré de nombreux affûts vespéraux, un seul **Butor étoilé** est contacté par ses cris le 16-03 et un oiseau est observé en vol en journée le 20-03. Fait majeur de cette période, s'ils restèrent infructueux pour le **Butor étoilé**, ces affûts crépusculaires permirent la détection de 26 **Grandes Aigrettes** en départ de migration nocturne depuis les marais, en direction du NE : 21 (5+2+6+3+5) le 16-03 et 5 le 24-03. Alors que la reproduction du **Grand Cormoran** est déjà bien entamée au sein des diverses colonies, 35 migrateurs actifs vers le NE sont notés le 11-03 et encore 25 le 23-03. Deux **Grues cendrées** se dirigeant vers l'E survolent le site le 06-03.

Les 1^{ers} comportements nuptiaux de **Busards des roseaux** coïncident avec les derniers contacts de **Busards St-Martin** : 1♀ en migration active vers le SW le 17-04 et 1♂ en vol le 26-04. Un **Milan royal** est vu le 07-03, 1 **Buse pattue** le 18-03, 1 **Milan noir** les 31-03 & 30-04 et 1 **Balbusard pêcheur** le 28-04. Un **Faucon pèlerin** fréquente la réserve les 19-03 & 15-04, ainsi que 2 le 10-04 et le 1^{er} **Faucon hobereau** est détecté à partir du 10-04. Un **Hibou moyen-duc** part en chasse le 16-03 et au moins 3 cantons distincts de **Chouette hulotte** et 1 de **Chevêche d'Athéna** sont défendus vocalement.

Sans atteindre des records, les niveaux d'eau sont bien remontés par rapport au printemps précédent, ce qui offre des lieux de gagnage plus efficaces aux limicoles de passage. Le **Pluvier doré** est particulièrement bien représenté avec 123 individus (max. 40 le 19-03) qui transitent par les marais durant les deux 1^{ères} décades de mars, 4 **Barges à queue noire** font halte le 09-03 et toujours 1 le 11-03, 2 **Avocettes élégantes** le 24-03, 1 **Courlis cendré** le 24-03, 2 **Echasses blanches** le 21-04, 1 **Petit gravelot** le 18-03, 1 **Chevalier culblanc** très irrégulièrement, un 1^{er} **Chevalier gambette** à partir du 09-03 et des **Chevaliers aboyeurs** isolés les 10 & 20-04. La **Bécassine des marais** n'est notée qu'à 6 reprises (max. 5 ind. le 04-03) et la croule de la **Bécasse des bois** est confirmée sur Hensies (dont la poursuite de 2♂). Une **Mouette pygmée** est présente les 07 & 15-04 puis 7 le 29-04, 2 **Guifettes noires** le 20 puis 1 le 25-04, 3 **Guifettes moustacs** le 08-04 et 1 **Guifette leucoptère** le 20-04. Parallèlement au retour des 1^{ères} **Sternes Pierre Garin** le 25-03, l'effectif local des **Mouettes mélanocéphales** progresse pour atteindre au max. 90 ind. le 18-04.

De 1 à 5 **Panures à moustaches** sont régulièrement mentionnées jusqu'au 24-03. Une **Locustelle lusciniôïde** laisse entendre sa stridulation si particulière à partir du 19-04. Par la suite, d'autres postes de chant sont ponctuellement occupés. Un canton de **Grive draine** est établi sur le terril de Bernissart (parcelles C). Une seule donnée de **Bruant jaune** est obtenue le 22-04. Après des max. au dortoir (roselière A) de 30 **Bruants des roseaux** le 14-03 puis 20 le 16-03, le cantonnement des nicheurs locaux s'impose partout au sein des marais.

Par ordre croissant des retours : **Tarier pâtre** (07-03), **Hirondelle de rivage** (09-03), **Gorgebleue à mb** (14-03), **Hirondelle rustique & Rougequeue noir** (17-03), **Pouillot fitis** (28-03), **Fauvette à tn** (30-03), **Phragmite des joncs** (05-04), **Rosignol philomèle & Traquet motteux** (07-04), **Locustelle tachetée** (08-04), **Hirondelle de fenêtre & Fauvette des jardins** (09-04), **Rousserolle effarvatte** (12-04), **Fauvette grisette** (15-04), **Fauvette babillarde & Pipit des arbres** (17-04), **Martinet noir** (20-04), une hâtive **Rousserolle verderolle & Berg. printanière** (21-04), **Tarier des prés** (22-04) et **Loriot d'Europe** (26-04).

Par ordre croissant des départs (hivernants) : **Tarin des aulnes** (27-03), **Grive litorne** (31-03), **Pipit spioncelle** (06-04), **Grive mauvis & Pinson du nord** (07-04) et **Sizerin flammé** (08-04).

Contributeurs : tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que leurs données aient été extraites du portail d'encodage www.observations.be ou nous soient parvenues par un autre canal. **Rédacteur** : Ph. Jenard pour le Comité de Gestion des Marais HHP, en partenariat avec le CRIE d'Harchies & la section NATAGORA - AVES MsTi. Adresse de contact : mons.tournai@aves.be